

Activity of total alkaline phosphatase in water of the Barlinek Lake of the during stagnation time of 2008

Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie jeziora Barlineckiego w okresie stagnacji letniej w 2008 roku

Piotr Daniszewski

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński,
ul. Felczaka 3C, 71-412 Szczecin, Poland

E-mail address: daniszewski@univ.szczecin.pl

ABSTRACT

To estimate differentiation of activity of total alkaline phosphatase in water of the Barlinek Lake, of the during stagnation time of 2008. Studies upon water revealed that, among the zones analyzed, upper sublittoral layer was characterized by the highest phosphatase activity. From the analysis of seasonal oscillations it follows that activity maximum for alkaline phosphatase, both in water, occurred July 2008.

Keywords:

total alkaline phosphatase activity; phosphorus; water; Barlinek Lake; summer stagnation

STRESZCZENIE

Badaniami objęto wodę jeziora Barlineckiego. Próbki do badań pobierano w okresie od kwietnia do października 2008 roku. Badania dotyczące wody wykazały, że spośród analizowanych stref najwyższą aktywność fosfatazy zasadowej posiadała górna warstwa sublitoralu. Z dokonanej analizy wahań w okresie stagnacji letniej wynika, że maksimum aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie występowała w badanym jeziorze w lipcu 2008 roku.

Słowa kluczowe

aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej, fosfor, woda, jezioro Barlineckie, stagnacja letnia

1. WPROWADZENIE

Najbardziej przyswajalną biologiczną formą fosforu w zbiornikach wodnych, są jony ortofosforanowe. Jony te powstają w reakcjach hydrolizy nierozpuszczalnych form fosforu [Siuda W., 2001; Koc A., Skwierawski A, 2004].

Poziom aktywności alkalicznej fosfatazy (APA) ma istotny wpływ na procesy chemiczne i biologiczne jakie zachodzą w środowisku wodnym [Berman T. 1970; Smith R.E.H., Kalff J., 1981; Chróst R.J. i in.. 1984; Siuda W. 1984; Jansson M., i in. 1988]. APA jest wskaźnikiem, który mówi nam o stopniu ograniczenia rozwoju biomasy w danym zbiorniku wodnym [Smith R.E.H., Kalff J., 1981; Siuda W. 1984; Forsberg 1993].

Jak wynika z dokonanego przeglądu literatury, jak dotąd nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących stanu jakości wód jeziora Barlineckiego. Celem badań w niniejszej pracy było prześledzenie w okresie stagnacji letniej (lipiec i sierpień) 2008 roku poziomu oraz dynamiki zmian w wodach jeziora Barlineckiego aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej [1-10].

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Badania przeprowadzono na jeziorze Barlineckim, które zajmuje powierzchnię 259,1 ha, posiada trzy dopływy i jeden odpływ. Otoczone jest morenowymi wzgórzami, w większości porośniętymi buczynami. Fragment brzegu zachodniego badanego jeziora przylega do łąk połączonych z polami uprawnymi. Północna i północno-wschodnia część jeziora graniczy z zabudowaniami miasta Barlinek (Marcinkiewicz W. 1963). Podstawowe dane morfometryczno-zlewniowe badanego jeziora przedstawiono w tabeli nr 1. Współrzędne geograficzne stanowisk pomiarowych rozmieszczonych na jeziorze Barlineckim:

Stanowisko nr 1 - N: 52° 58' 19,31" E: 15° 11' 45,69"

Stanowisko nr 2 - N: 52° 58' 45,74" E: 15° 12' 27,14"

Stanowisko nr 3 - N: 52° 59' 05,08" E: 15° 13' 07,81"

Stanowisko nr 4 - N: 52° 59' 27,55" E: 15° 13' 12,20"

Tabela 1. Dane morfometryczno-zlewniowe jeziora Barlineckiego

Lp.	Nazwa jeziora Lake name	Szerokość geograficzna Latitude	Długość geograficzna Longitude	Wysokość n.p.m. Height above see level	Głębokość maksymalna Maximal depth	Głębokość średnia Average depth	Powierzchnia zw. wody Water surface area
		N	E	m	m	M	ha
		52°58,9'	15°12,9'	57,0	18,0	7,1	259,1
1.	Barlineckie (Barlińskie)	Powierzchnia wysp Island area	Objętość Volume	Długość maksymalna na Maximal length	Szerokość maksymalna Maximal width	Linia brzegowa misy jeziora Coastline of lake's basin	Linia brzegowa wysp Islands coastline
		ha	10 ³ m ³	m	m	M	m
		3,7	18579,8	3770	2150	10450	1550

Do badań próbki wody litoralnej i sublitoralnej pobierano za pomocą aparatu Ruttnera o pojemności 2 dm³. Dalsze postępowanie z pobranymi próbkami wody było prowadzone zgodnie z PN/C-04632.03 - Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Technika pobierania próbek. i PN/C-04632.04 - Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Utrwalanie i przechowywanie próbek.

Wodę przez dobę przechowywano w temperaturze 4°C. Po okresie tym określano w wodzie aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej metodą Jonesa [Jones J.G. 1972]. Metoda Jonesa oznaczania aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej polega na wykryciu barwnego p-nitrofenolu powstałego z fosforanu p-nitrofenolu rozpuszczonego w buforze (0,1 M Tris-HCl o pH 8,5) [Jones J.G. 1972]. Badania prowadzone były w okresie w 2008 roku w miesiącu lipcu i sierpniu. Analizy wykonywano raz w miesiącu w trzech powtórzeniach. Przedstawione w pracy wyniki stanowią średnią z tych powtórzeń.

3. DYSKUSJA WYNIKÓW

Wyniki badań aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej w wodach jeziora Barlineckiego zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie (nmol PO₄·dm⁻³·h⁻¹)

Lp.	Terminy badań	Litoral	Sublitoral
		1 m	4 m
1.	24.07.2008	637,6	510,4
2.	20.08.2008	476,3	472,1
3.	Średnia	556,95	491,25

Powyższe wyniki wskazują, że aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie jeziora Barlineckiego kształtowała się na najwyższym poziomie w okresie lipca, zarówno w litoralu jak i sublitoralu. W litoralu poziom badanego wskaźnika wynosił 637,6 nmol PO₄·dm⁻³·h⁻¹, a w sublitoralu od 510,4 nmol PO₄·dm⁻³·h⁻¹. Podczas prowadzonych badań aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej, wody ocenianego jeziora, nie podlegała istotnym wahaniom w okresie lipiec – sierpień 2008 roku. Poszerzone badania wód jeziora Barlineckiego w 2008 roku w zakresie określenia zmian aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej oraz wartości 19 wskaźników, które określają jakość wód, zostały przedstawione w pracach Daniszewski.

4. WNIOSKI

1. Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie jeziora Barlineckiego była najwyższa w warstwie sublitoralu w okresie stagnacji letniej w miesiącu lipcu.
2. Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie badanego jeziora nie podlegała istotnym wahaniom w okresie stagnacji letniej.

LITERATURA

- [1] Barik S.K., Purushothaman C.S., Mohanty A.N., *Aquaculture Research*, 32 (2001) 819-832
- [2] Berman T.. *Alkaline phosphatases and phosphorus availability in lake Kinneret. Limnol. and Oceanogr.*, XV (5), (1970) 663-674.
- [3] Chróst R.J., Siuda W., Halemejko G.Z. 1984.. *Arch. Hydrobiol. Suppl.*, 70, 1 (1984) 1-32.
- [4] Daniszewski P., *International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy* 1 (2012) 6-12.
- [5] Daniszewski P., *International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy* 1 (2012) 13-16.
- [6] Koc A., Skwierawski A, *Fosfor w wodach obszarów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu*, (2004) 1017, 168
- [7] Marcinkiewicz W., *Barlineckie Jezioro*. Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 1963
- [8] Siuda W., *Polish Archives of Hydrobiology*, 31 (1984) 207-233.
- [9] Siuda W., *Post. Mikrobiol.*, 40, 2, (2001) 187-217.
- [10] Smith R.E.H., Kalf J., *Can. J. Fish Aquat Sci.*, 38 (1981) 1425.

Polskie Normy

PN/C-04632.03. Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Technika pobierania próbek.

PN/C-04632.04. Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Utrwalanie i przechowywanie próbek.

PN/C-06504. Przygotowanie roztworów buforowych.